

抗がん剤副作用

すずき

タキソール+カルボプラチン 週に一回点滴したら3週間休薬するマンスリー法で、6クール

消化器系 食欲不振になり、猫飯やお茶漬けでかき込む 吐き気はなし 少し便秘ぎみ
神経系 手足の痺れあり 筋肉、関節痛、足の裏が痛い、寝ていても痛さ

で熟睡できない、貼り薬を貼ると少し楽になる。
手の指先が痺れて他人の手のようになる。食器なんかも落としそうになる。
少し便秘気味になる。腸閉塞が怖いので漢方の下剤を飲む
味覚障害がある。甘さ、辛さがわからない。

骨髄抑制 白血球が1300位まで下がる。注射で3000まで上げて、抗がん剤を点滴する
脱毛 髪の毛から始まり、全ての体毛が抜ける。点滴を止めて三ヶ月辺りから産毛が
生えて、生え揃うには約一年かかった。

その他 爪の色が黒くなる。アルコール分があるために酩酊状態のように顔が赤く
なる。

タキソール+シスプラチン TP,TCの差異は判らない。

タキソテール+カルボプラチン 白血球の下がりやタキソールよりも大きい、その他の副作

用

軽く、神経系は特に軽い。投与中も髪の毛は細いものの生え
てくる。

タキソテール+テトポシン 吐き気が二三回あったが、その他の目立った無い。眉毛が生え
だす。ウィークリー法の為に副作用が軽い。

その他にはっきりしないが、記憶力、気力の衰退があるような気がして心配である。

ちょこたん

タキソテール+カルボプラチン

骨髄抑制・・・・・・・・白血球低下が著しく、2000弱まで下がる。

予定は3週間に1回のペースだったが、白血球の注射を打って上

げながらも4週に1回となる。

食欲不振・・・・・・・・投与後4～5日間、むかむかとかかったさなど。

脱毛・・・・・・・・徐々に抜け始め、投与が続くうちに全て抜ける。

初めてどっさり抜けていくのを見たときはガックリするも、やがて慣

れる。